

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	バストミン
2	成分・分量	100g中 エチニルエストラジオール 0.02g、エストラジオール 0.06g
3	用法・用量	適当量を局所に塗擦する。
4	効能・効果	婦人更年期障害、卵巣ホルモン不足により欠落症、女性生殖器発育不全、無月経、月経困難症、月経周期異常、卵巣機能障害、不正子宮出血、乳汁分泌不全、不妊症、不感症、四肢冷感症。
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください。</p> <p>(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(2) ご使用前に本剤をチューブから3mm程度出し、内股など皮膚のうすい所に塗り、翌日中に薬疹、発赤、かゆみ、はれなどの症状があらわれた人</p> <p>(3) 血栓症、子宮内膜症、脳卒中、心疾患、腎疾患のある人又はその既往歴のある人</p> <p>(4) 乳房又は子宮、卵巣に腫瘍がある人およびこれらのおそれがある人 [本剤の有効成分は乳房や子宮の悪性腫瘍に罹患していた場合、その進行を早めるおそれがあります]</p> <p>(5) 家族あるいは本人に悪性腫瘍の病歴がある人</p> <p>(6) 子宮筋腫、糖尿病、高血圧、てんかん、肝機能障害のある人</p> <p>(7) 生理中の人、不正性器出血、膣分泌物(おりもの)のある人</p> <p>(8) 妊婦又は妊娠している可能性のある女性、授乳婦</p> <p>(9) 小児</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください。</p> <p>(1) 目や目の周囲</p> <p>(2) 外傷、湿疹、ただれ、炎症および化膿のひどい患部</p> <p>3. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。 同じ成分を含んだその他の医薬品</p> <p>4. 本剤を使用している間は、次のいずれの食品も摂取しないでください。 セイヨウオトギリソウ(セント・ジョーンズ・ワート)含有食品、イプリフラボン</p> <p>5. 使用者以外へ付着させないでください。</p> <p>(1) ご使用後は石鹼とぬるま湯で手を十分に洗ってください。</p> <p>(2) 本剤を使用者以外の人に付着させないように注意してください。付着した場合は直ちに洗い流してください。</p> <p>(3) 塗布部が他の人と接触する可能性があるときは、塗布部を石鹼とぬるま湯で十分に洗い流してください。</p> <p>6. 避妊の目的で使用しないでください。</p> <p>(1) 避妊をご希望の場合は、適切な処置を強くお願いいたします。</p> <p>(2) 本剤のご使用により月経周期が変わる場合がありますので、オギノ式など規則的な月経周期や基礎体温を応用する避妊法は、お止めください。</p>
6	薬剤師が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

2020年3月改訂